

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Гриппферон® с лоратадином

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Гриппферон® с лоратадином

Международное непатентованное наименование или группировочное наименование:

интерферон альфа-2b + лоратадин

Лекарственная форма: мазь назальная

Состав на 1 г мази:

Действующие вещества: интерферон альфа-2b человеческий рекомбинантный - не менее 10 000 МЕ, лоратадин - 2 мг.

Вспомогательные вещества: борная кислота, натрия тетраборат, глицерин, динатрия эдетат дигидрат, гипромеллоза, макрогол 400, макрогол 4000, вода очищенная.

Описание

Мазь белого или белого с желтоватым оттенком цвета со слабым специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Иммуностимуляторы, интерфероны.

Код АТХ L03AB

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Препарат Гриппферон® с лоратадином, мазь назальная, обладает иммуномодулирующим, противовирусным, противовоспалительным, антигистаминным, противоаллергическим, противозудным, антиэкссудативным действием.

Интерферон альфа-2b обладает иммуномодулирующим и противовирусным действием.

Лоратадин — блокатор H₁-гистаминовых рецепторов. Оказывает местное противоаллергическое действие, уменьшает отечность слизистых оболочек и мягких тканей, уменьшает экссудацию, жжение и зуд, облегчает проходимость носовых ходов, облегчает носовое дыхание. Обладает противовоспалительным действием.

Фармакокинетика

При интраназальном применении концентрация действующих веществ, достигаемая в плазме крови, значительно ниже предела обнаружения современными аналитическими методами и не имеет клинической значимости.

Показания к применению

Профилактика и лечение гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в составе комплексной терапии у взрослых, в том числе у пациентов с аллергическим ринитом.

Противопоказания

Гиперчувствительность к интерферону альфа-2b, лоратадину или другим компонентам препарата, детский возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности препарата у детей), беременность, период грудного вскармливания.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Интраназально.

Для лечения гриппа и ОРВИ 5 раз в день смазывать слизистую оболочку носа, выпустив по 1 см препарата в каждый носовой ход в течение 7 дней.

Для профилактики гриппа и ОРВИ (после контакта с заболевшим) 1 раз в день (утром) смазывать слизистую оболочку носа, выпустив по 1 см препарата в каждый носовой ход в течение 7 дней.

Перед нанесением мази необходимо очистить полость носа, а после нанесения - помассировать крылья носа для лучшего распределения мази по поверхности слизистой оболочки носа.

Побочное действие

Возможно чиханье, зуд в месте нанесения, временное нарушение обоняния.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки препарата не выявлены.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Применение интраназальных сосудосуживающих препаратов совместно с препаратом Гриппферон® с лоратадином не рекомендуется, так как это способствует дополнительному высушиванию слизистой оболочки носа.

Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами

Не влияет на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Форма выпуска

Мазь назальная 10 000 МЕ/г + 2 мг/г.

По 5 г в тубах алюминиевых с бушонами. По одной тубе вместе с инструкцией по медицинскому применению в пачке из картона.

Условия хранения

При температуре от 2 до 8 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителя

ООО «Фирн М», 108804, г. Москва, вн.тер.г. м.о. Внуково, дп. Кокошкино,
ул. Дзержинского, д. 4А

Тел.: 8 (495) 956-15-43