

## ИНСТРУКЦИЯ

### ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

#### **КАЛАНХОЭ СОК** (Kalanchoë's succus)

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование:** Каланхоэ сок

**Международное непатентованное или группировочное наименование:** Каланхоэ побеги свежие

**Лекарственная форма:** раствор для местного и наружного применения спиртовой

#### **Состав**

**Для приготовления препарата необходимо:**

- |                                |                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Каланхоэ побегов свежих        | – достаточное количество<br>до получения 760 мл сока<br>неконсервированного |
| Спирта этилового (этанол) 95 % | – достаточное количество<br>до получения 1000 мл препарата                  |

#### **Описание**

Жидкость от светло-желтого до коричневого цвета с характерным запахом. Допускается наличие осадка.

#### **Фармакотерапевтическая группа**

Стимулятор репарации тканей растительного происхождения.

#### **Код АТХ**

Не присвоен.

#### **Фармакологическое действие**

Оказывает местное противовоспалительное действие, способствует очищению ран и язв от некротических тканей, стимулирует регенерацию.

#### **Показания к применению**

Трофические язвы, незаживающие раны, ожоги, пролежни, трещины сосков у кормящих матерей, различные заболевания полости рта и пародонта (афтозный стоматит, гингивит, пародонтит).

### **Противопоказания**

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 18 лет.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно после согласования с врачом.

### **Способ применения и дозы**

Наружно. Рану или язву орошают препаратом (1-3 мл) и накладывают марлевую повязку (4-5 слоев), обильно смоченную препаратом. Повязку меняют вначале ежедневно, затем через день. Один раз в день дополнительно смачивают нижние слои повязки препаратом (сняв верхние слои). Курс лечения 15-20 дней.

При трещинах сосков после каждого кормления на соски наносят пипеткой несколько капель препарата. Перед кормлением остатки препарата следует тщательно смыть теплой кипяченой водой. Курс лечения 4-5 дней.

Местно. В стоматологии препарат назначают в виде аппликаций ежедневно на слизистую оболочку полости рта 3-4 раза в день; длительность аппликации составляет 15-20 минут. Курс лечения 7-14 дней.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции. В редких случаях – ощущение жжения в ране.

*Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.*

### **Передозировка**

До настоящего времени случаев передозировки при применении препарата не зарегистрировано.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не описано.

### **Особые указания**

При появлении в ране ощущения жжения необходимо при последующем использовании добавить к препарату 2 % раствор новокаина из расчета 2 мл на 100 мл препарата.

Перед применением препарата «местно» его следует подогреть на водяной бане до температуры 37 °С.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

### **Форма выпуска**

Раствор для местного и наружного применения спиртовой.

По 20 мл во флаконы нейтрального стекла, герметически укупоренные пробками с последующей обкаткой колпачками алюминиевыми.

На флаконы наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей или этикетки самоклеящиеся.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

### **Условия хранения**

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

### **Держатель регистрационного удостоверения**

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Адрес: 142279, Московская обл., Серпуховский р-н, рабочий пос. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел.: (495) 716-15-81, 716-15-90.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ  
от 02.12.2024 № 26600  
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

**Производитель/организация, принимающая претензии от потребителей**

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия.

Адрес: 142279, Московская обл., Серпуховский р-н, рабочий пос. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел.: (495) 716-15-81, 716-15-90.