

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

МАТЬ-И-МАЧЕХИ ЛИСТЬЯ

Tussilaginis farfarae folia

Регистрационный номер.

Торговое наименование. Мать-и-мачехи листья.

Международное непатентованное или группировочное наименование. Мать-и-мачехи обыкновенной листья.

Лекарственная форма. Листья измельченные.

Состав. Мать-и-мачехи обыкновенной листья.

Характеристика.

Листья мать-и-мачехи содержат полисахариды, дубильные вещества, горечи, флавоноиды и другие биологически активные вещества.

Описание.

Кусочки листьев различной формы. Цвет светло-зеленый, зеленый, беловато-серый, серовато-зеленый с желтовато-зелеными, коричневатозелеными, светло-коричневыми или фиолетовыми вкраплениями. Запах отсутствует. Вкус водного извлечения слабо-горьковатый с ощущением слизистости.

Фармакотерапевтическая группа.

Отхаркивающее средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие.

Настой листьев мать-и-мачехи оказывает отхаркивающее, слабое противовоспалительное действие. Слизь (полисахариды), органические кислоты и сапонины способствуют разжижению вязкого отделяемого в верхних дыхательных путях, улучшению отхождения мокроты. Благодаря высокому содержанию слизи препараты мать-и-мачехи оказывают обвола-

квивающее действие на слизистые оболочки полости рта и горла, предохраняя их от раздражения.

Показания к применению.

Воспалительные заболевания дыхательных путей (ларингит, трахеит, бронхит, бронхопневмония), сопровождающиеся кашлем с трудноотделяемой мокротой, – в составе комплексной терапии.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к препарату; беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы.

Около 10 г (2 столовые ложки) листьев мать-и-мачехи помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой, нагревают на кипящей водяной бане 15 минут, охлаждают при комнатной температуре 45 минут, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Настой принимают внутрь в теплом виде взрослые и дети с 12 лет по 2-3 столовые ложки 2-3 раза в день за 1 час до еды. Курс лечения 7-10 дней.

Перед применением настоя рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие.

Возможны аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка.

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Одновременное применение препарата с противокашлевыми лекарственными средствами (в том числе содержащими кодеин, декстрометорфан) не рекомендуется, так как это затрудняет отхождение разжиженной мокроты.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска.

Листья измельченные. По 30 г, 35 г, 40 г, 45 г, 50 г, 60 г, 75 г, 100 г листьев измельченных в пачках из картона с контролем первого вскрытия с внутренним пакетом из бумаги с термосвариваемым полипропиленовым слоем или бумаги с термосвариваемым полиэтиленовым слоем, или алюминиевой фольги, или материала комбинированного многослойного, или полипропилена.

Инструкция по применению вкладывается в пачку или текст инструкции в полном объеме наносится на пачку.

Условия хранения.

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С; приготовленный настой – в прохладном месте не более 2-х суток.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности.

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска.

Отпускают без рецепта.

Производитель / Держатель регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии

АО «Красногорсклексредства»

Россия, 143444, Московская обл., г. Красногорск, ул. Мира (Опалиха мкр.), д. 25

Тел.: +7 (495) 705-93-80 • Факс: +7 (495) 705-93-82 • krls@krls.ru

Адрес производственной площадки (выпускающий контроль качества): Россия, Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 25