

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ВЕРРУКАЦИД®

Регистрационный номер:

Торговое наименование:

Веррукацид®

Международное непатентованное или группировочное наименование:

Метакрезол + фенол

Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Состав:

1 г раствора содержит:

Действующие вещества: фенол – 588 мг, 3-метилфенол (метакрезол) – 392 мг.

Вспомогательные вещества: спирт этиловый (этанол) 95 % – 10 мг, вода очищенная до 1,0 г.

Описание: подвижная маслянистая жидкость от розоватого или светло-желтого до коричневого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: другие препараты, применяемые в дерматологии; препараты для лечения бородавок и мозолей.

Код АТХ: D11AF

Фармакологические свойства

Обладает прижигающим действием, коагулирует белки кожи.

Показания к применению

Обычные, нитевидные и подошвенные бородавки, папилломы, остроконечные кондиломы кожи, сухие мозоли, кератомы.

Препарат показан к применению у взрослых и детей с 7 лет.

Противопоказания

Гиперчувствительность к фенолу и 3-метилфенолу (метакрезолу) или к любому из вспомогательных веществ, пигментные невусы (родинки), высыпания, расположенные на красной кайме губ и слизистых оболочках. Нельзя наносить препарат на поверхность кожи площадью более 20 см².

Дети до 7 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата возможно в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. В период лактации не рекомендуется удалять образования, расположенные на молочных железах и кистях рук.

Способ применения и дозы

Веррукацид® предназначен только для наружного применения.

Препарат наносят **точно** на обрабатываемый участок специальным аппликатором или небольшой тонкой деревянной палочкой, не допуская попадания его на соседние здоровые участки кожи и слизистые оболочки.

На мелкие папилломы (размером до 2 мм) и нитевидные бородавки Веррукацид® наносят однократно.

Более крупные папилломы и небольшие бородавки (размером 2-3 мм) смазывают препаратом 3-4 раза, делая перерывы для подсыхания нанесенной жидкости.

Перед удалением Веррукацидом® бородавок с плотной ороговевшей поверхностью на кистях, подошвенных бородавок, кератом, сухих мозолей необходимо устранить с их поверхности роговые наслоения. Для этого на несколько часов наносят кератолитическую мазь (например, 10 % салициловую или др.), покрывая смазанный участок компрессной бумагой или полиэтиленовой пленкой, а затем используют марлевую повязку. Возможно заклеивание лейкопластырем. После этого повязку или лейкопластырь снимают, кожу распаривают в горячей воде с добавлением мыла и соды в течение 10-15 минут и удаляют роговые наслоения (срезают маникюрными ножницами или щипца-

ми). На подсушенную кожу наносят Веррукацид® несколько раз, делая 3-4-минутные перерывы для подсыхания препарата.

Бородавки на кистях и подошвах обрабатывают препаратом Веррукацид® 7-10 раз с интервалом 3-4 мин.

Кератомы и сухие мозоли достаточно обработать 3-4 раза с интервалом 3-4 мин.

При необходимости многократного нанесения препарата во избежание ожога окружающей кожи целесообразно смазать ее цинковой пастой. Паста удаляется сухим марлевым тампоном после подсыхания последней порции Веррукацида®.

Остроконечные кондиломы не рекомендуется удалять самостоятельно, их обработка Веррукацидом® проводится в процедурном кабинете поликлиники дерматовенерологом или урологом. Препарат Веррукацид® наносят на каждый элемент в отдельности 1-2 раза с интервалом в 3-4 мин.

Повторную обработку при необходимости проводят через 6-8 дней после отпадения корочки. Допускается проведение 4-5 процедур.

Побочное действие

Ожог (при попадании на здоровую кожу). При случайном попадании препарата на здоровую кожу необходимо немедленно, осторожно, не растирая, удалить его с кожи, а затем обработать пораженные места этиловым спиртом 10-40% или спиртосодержащими жидкостями (водка, лосьон, одеколон) и тщательно обмыть тёплой водой с мылом. При возникновении ожога рекомендуется применять противоожоговые и заживляющие средства. Отёк и покраснение кожи при нанесении в области глаз, проходящие самостоятельно. Аллергические реакции.

Передозировка

Не выявлена.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Компоненты препарата легко растворяются в мазевой основе, в связи с чем смазывать какими-либо мазями обработанный Веррукацидом® участок кожи не рекомендуется.

Особые указания

Нельзя допускать попадания препарата на слизистые оболочки, особенно на слизистую оболочку глаз. При попадании необходимо немедленно промыть глаза большим количеством воды и обратиться к врачу-офтальмологу.

Недопустимо бинтование участков, обработанных препаратом, заклеивание их пластырем, смазывание какими-либо мазями и удаление корочки; нельзя повторно наносить препарат раньше сроков, указанных выше. Одежда из синтетических тканей не должна прикасаться к участку кожи, обработанному препаратом.

Не рекомендуется наносить Веррукацид® на образования, расположенные в кожных складках (паховые складки, анальная область, межпальцевые промежутки и др.) и сильно потеющие участки во избежание ожогов неповрежденной кожи соприкасающейся поверхности или в результате растекания препарата по влажной коже.

Обработанный Веррукацидом® участок кожи должен высохнуть на воздухе, его нельзя смазывать какими-либо мазями, мыть водой в первый день после обработки.

При правильном применении препарат не оставляет рубцов.

Особая аккуратность и осторожность требуется при лечении препаратом детей.

В случае выпадения кристаллов флакон перед применением следует нагреть на водяной бане при температуре от 30 до 40 °С при легком встряхивании, после растворения кристаллов препарат годен к применению.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами

Препарат Веррукацид® не оказывает влияние на способность управлять

транспортными средствами и работать с механизмами.

Форма выпуска

Раствор для наружного применения.

По 2 и 10 г во флаконы темного стекла, укупоренные навинчиваемыми пластмассовыми крышками с контролем первого вскрытия и прокладкой или навинчиваемыми пластмассовыми крышками с аппликатором или навинчиваемыми пластмассовыми крышками с прокладкой.

Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Дополнительно в каждую пачку из картона может быть вложена пластмассовая крышка с аппликатором.

Условия хранения

При температуре от 15 до 25 °С в оригинальной упаковке (флакон в пачке) для защиты от света.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/Производитель/

Организация, принимающая претензии:

АО «Ретиноиды», Россия

Юридический адрес:

143983, Московская обл. г. Балашиха, ул. Свободы
(Керамик мкр.), д.1А, офис 404

Адрес места производства

и принятия претензий:

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 05.11.2024 № 24363
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

143983, Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха,

мкр. Керамик, ул. Свободы, д.1А

Тел./факс: (495) 234-61-17

www.retinoids.ru