

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ПЕРЦА СТРУЧКОВОГО НАСТОЙКА

Регистрационный номер:

Торговое наименование Перца стручкового настойка

Международное непатентованное или группировочное наименование

Перца стручкового плодов настойка

Лекарственная форма настойка для наружного применения

Состав

Для получения 1000 мл настойки используют:

Перца стручкового плоды - 100 г

Вспомогательное вещество:

Этанол (спирт этиловый) 90 % до получения 1000 мл настойки.

Описание Прозрачная жидкость красновато-желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты для наружного применения при мышечных и суставных болях; капсаицин и подобные средства.

Код АТХ: M02AB

Фармакологические свойства

Фармакологические свойства препарата обусловлены содержанием алкалоида капсаицина. Препарат обладает местным раздражающим, отвлекающим и разогревающим действием, вызывая усиление местного кровотока в коже, воздействуя на болезненные процессы, локализованные также и в глубине тканей.

Показания к применению

В качестве местнораздражающего и отвлекающего средства при невралгиях, радикулитах, миозитах, люмбаго, люмбоишиалгии.

Противопоказания

Гиперчувствительность к перцу стручкового плодам, дерматологические заболевания в месте нанесения препарата, нарушение целостности кожных покровов, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Наружно. Небольшое количество препарата втирают в соответствующий участок кожи 1 - 2 раза в сутки. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Аллергические реакции, сильное жжение в месте нанесения препарата. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Особые указания

Не допускать попадания препарата в глаза. Препарат не следует наносить на слизистые оболочки, открытые раны и повреждённые или воспалённые участки кожи. После применения препарата необходимо тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. При попадании препарата в рот или нос необходимо тщательно промыть их водой.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияние на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Настойка для наружного применения.

25 мл во флаконы темного стекла, укупоренные пробками полимерными и навинчиваемыми крышками.

4,5 л; 5 л; 10 л; 19 л; 20 л в канистры из полиэтилена низкого давления (для производственных отделов аптек).

1 флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

1 флакон помещают в пачку из картона, на которую нанесен полный текст инструкции по применению.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 12 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/Держатель регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии от потребителей

ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика»

Россия, 170024, г. Тверь, Старицкое шоссе, д. 2

Тел./факс (4822) 44-41-19