

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ПЛАНТАГЛЮЦИД®

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Пантаглюцид®

Международное непатентованное или группировочное наименование: Подорожника
большого листьев экстракт

Лекарственная форма: гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь

Состав на упаковку:

Активного компонента

Пантаглюцида® экстракта сухого	– 0,5 г	– 1,0 г
--------------------------------	---------	---------

(Подорожника большого листьев экстракт)

с содержанием суммы восстанавливающих
сахаров в пересчете на глюкозу

и абсолютно сухое вещество 9,0 %

Вспомогательного вещества

Сахара (сахароза)	– 0,5 г	– 1,0 г
-------------------	---------	---------

Масса гранул в упаковке	– 1,0 г	– 2,0 г
-------------------------	---------	---------

Описание

Гранулы темно-серого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта; другие
средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта.

Код АТХ: A03AX.

Фармакологическое действие

Препарат растительного происхождения. Понижает тонус гладких мышц желудка
и кишечника, оказывает умеренное спазмолитическое, противовоспалительное действие,
уменьшает отечность складок слизистой оболочки желудка. Регулирует секрецию
желудочного сока, повышая его кислотность, главным образом, у больных
с гипоацидностью.

Показания к применению

Препарат показан к применению у взрослых и детей в составе комплексной терапии при гипоацидном гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки при нормальной или пониженной кислотности.

Противопоказания

Гиперчувствительность, гиперацидный гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки при повышенной кислотности.

Беременность, период грудного вскармливания.

Дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, декомпенсированный сахарный диабет.

С осторожностью

Пациентам с сахарным диабетом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Лечение: взрослым по 1/2 - 1 чайной ложке (0,5 г - 1 г) 2-3 раза в сутки. Длительность курса лечения – 3-4 недели.

Для профилактики рецидивов по 1 чайной ложке (1 г) 1-2 раза в сутки в течение 1-2 месяцев.

Лечение: детям по 1/2 чайной ложке (0,5 г) 2-3 раза в сутки. Длительность курса лечения – 3-4 недели.

Профилактическое применение препарата возможно только у взрослых.

Внутрь, за 20-30 мин до еды, разводя перед приемом в 1/4 стакана теплой воды.

Если в период лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, изжога.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки при применении препарата не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Особые указания

Препарат содержит сахарозу. Пациентам с наследственной непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или врожденной недостаточностью сахаразы/изомальтазы не следует принимать этот препарат.

Разовая доза препарата (1 г) содержит 0,5 г сахарозы, что эквивалентно 0,041 хлебных единиц (ХЕ).

Разовая доза препарата (2 г) содержит 1 г сахарозы, что эквивалентно 0,083 хлебных единиц (ХЕ).

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь по 1,0 или 2,0 г в пакетах из целфлена или из бумаги упаковочной с полиэтиленовым покрытием. 20 или 25 пакетов вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В сухом месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

**Держатель регистрационного удостоверения/Производитель/Организация,
принимающая претензии потребителей**

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Адрес: 142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел.: (495) 716-15-81, 716-15-90.