

И Н С Т Р У К Ц И Я
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ФОРМАГЕЛЬ®

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Формагель®

Международное непатентованное или группировочное наименование:
Формальдегид

Лекарственная форма: гель для наружного применения.

Описание: однородный бесцветный гель со слабым запахом формальдегида.

Состав

Действующее вещество:

Формалин (в пересчете на формальдегид) 37 мг.

Вспомогательные вещества:

Метилцеллюлоза (метилцеллюлоза водорастворимая) 25 мг, вода очищенная до 1,0 г.

Фармакотерапевтическая группа: антисептики и дезинфицирующие средства; другие антисептики и дезинфицирующие средства.

Код АТХ (D08AX).

Фармакологические свойства

Подавляет функцию потовых желез, оказывает дезинфицирующее и антисептическое действие.

Показания к применению

Повышенное потоотделение.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к формальдегидсодержащим соединениям, в том числе к формалину, воспалительные заболевания кожи. Детский возраст до 16 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Не рекомендуется применять при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Наружно. На участки кожи с повышенной потливостью (подошвы, ладони, межпальцевые складки) после гигиенического душа и высушивания Формагель®

наносят тонким слоем на 30-40 мин. Затем препарат смывают теплой водой. На нежную чувствительную кожу (подмышечные впадины и ладони у женщин) препарат нужно наносить тонким слоем на срок не более 20 мин. После этого кожу следует тщательно вымыть теплой водой без моющих средств и припудрить тальком или детской присыпкой. После бритья подмышечных впадин Формагель® можно наносить не ранее, чем через сутки. Расход на одно применение – около 4 г. Одной процедуры достаточно, чтобы снизить потливость кожи на 7-12 дней. При резко выраженной потливости процедуру проводят 2-3 дня подряд. При необходимости применение Формагеля® можно повторить.

Побочное действие

Аллергические реакции. При длительном использовании – сухость кожи. В этом случае применение Формагеля® временно прекращают.

В случае возникновения на месте нанесения раздражения (покраснение, жжение, отек) оно устраняется смазыванием кожи любыми кортикостероидными кремом или мазью 1-2 раза в день или нанесением суспензии Циндол несколько раз в день до устранения раздражения.

Передозировка

Случаи передозировки не описаны.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Исследования взаимодействия не проводились.

Особые указания

Не допускать попадания препарата на слизистые оболочки и в области глаз. При случайном попадании их необходимо обильно промыть водой.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат Формагель® не оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Форма выпуска

Гель для наружного применения 3,7 %.

По 15 г и 35 г в тубы алюминиевые с навинченными полимерными бушонами. Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Срок годности

5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

В недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения /Производитель/

Организация, принимающая претензии:

АО «Ретиноиды», Россия

Юридический адрес:

143983, Московская обл., г. Балашиха, ул. Свободы (Керамик мкр.),
д.1А, офис 404

Адрес места производства и принятия претензий:

143983, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Керамик, ул. Свободы, д.1А

Тел./факс: (495) 234-61-17

www.retinoids.ru