

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Аллохол

Регистрационный номер:**Торговое наименование:** Аллохол**Международное непатентованное или группировочное наименование:** Активированный уголь + Желчь + Крапивы двудомной листья + Чеснока посевного луковицы.**Лекарственная форма:** таблетки, покрытые пленочной оболочкой**Состав на одну таблетку***Действующие вещества:*

Желчь крупного рогатого скота - 80 мг

Чеснока посевного луковицы - 40 мг

Крапивы двудомной листья - 5 мг

Активированный уголь - 25 мг

Вспомогательные вещества:

крахмал картофельный, магния оксид, тальк, кремния диоксид коллоидный (аэросил), кальция стеарат;

оболочка:

VIVASOAT PM-2P-050 [гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) (Е 464), титана диоксид, тальк, макрогол-3350 (полиэтиленгликоль-3350), гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза), краситель солнечный закат желтый (Е 110), краситель хинолиновый желтый (Е 104), краситель железа оксид желтый (Е 172)];

ОПАДРАЙ II 85F19250 прозрачный (OPADRY II 85F19250 Clear) [поливиниловый спирт, макрогол (полиэтиленгликоль), тальк, полисорбат-80 (твин-80)].

Описание

Круглые, двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой от светло-желтого до желтого цвета. На поперечном разрезе ядро серовато-черного цвета, допускаются светлые вкрапления.

Фармакотерапевтическая группа: желчегонное средство.

Код АТХ: A05AX

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Комбинированный препарат. Желчегонное (холекинетическое и холеретическое) средство, снижает процессы гниения и брожения в кишечнике. Усиливает секреторную функцию клеток печени, рефлекторно повышает секреторную и двигательную активность органов желудочно-кишечного тракта. Усиливает образование желчи и желчных кислот.

Действие желчи обусловлено рефлекторным влиянием на секреторную функцию паренхимы печени. Желчь усиливает также секреторную и двигательную функции желудочно-кишечного тракта. Вещества, содержащиеся в чесноке, усиливают секреторную и моторную функции желудочно-кишечного тракта, стимулируют секрецию желчи. Листья крапивы обладают желчегонным и противовоспалительным свойствами. Уголь активированный является адсорбентом, связывающим токсические вещества в желудочно-кишечном тракте.

Фармакокинетика

Действующие вещества препарата хорошо всасываются в желудочно-кишечном тракте. Холевая и хенодезоксихолевая кислоты, содержащиеся в препарате, подвергаются 7-альфа-дегидроксилированию в кишечнике. Хенодезоксихолевая кислота, кроме того, подвергается метаболизму в печени: конъюгирует с аминокислотами, секретируется в желчь, откуда вновь выделяется в кишечник, затем частично реабсорбируется; остальная часть выводится через кишечник.

Показания к применению

В составе комплексной терапии: хронический реактивный гепатит, холангит, бескаменный (некалькулезный) холецистит, дискинезия желчевыводящих путей по гипокинетическому типу, атонический запор, постхолецистэктомический синдром.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, калькулезный холецистит, обтурационная желтуха, острый гепатит, острая и подострая дистрофия печени, язвенная

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в фазе обострения), острый энтероколит, острый панкреатит, детский возраст до 12 лет.

Применение во время беременности и в период грудного вскармливания

При беременности и в период грудного вскармливания применение препарата возможно по рекомендации врача и только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Внутрь, после еды.

Взрослым - по 1-2 таблетки 3-4 раза в сутки.

Детям старше 12 лет – по 1 таблетке 3 раза в день.

Курс лечения 3-4 недели.

При обострении заболеваний по 1 таблетке 2-3 раза в день в течение 1-2 месяцев.

Перед применением препарата у детей следует проконсультироваться с врачом.

Если после лечения улучшение не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

Побочные действия представлены в зависимости от воздействия на органы и системы органов.

Для определения частоты возникновения побочных эффектов препарата применяют следующую классификацию: очень часто ($\geq 1/10$); часто ($\geq 1/100$ и $< 1/10$); нечасто ($\geq 1/1000$ и $< 1/100$); редко ($\geq 1/10000$ и $< 1/1000$); очень редко ($< 1/10000$); частота неизвестна (не может быть установлена на основании имеющихся данных).

Нарушения со стороны иммунной системы: частота неизвестна - аллергические реакции.

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: частота неизвестна - диарея.

Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей: частота неизвестна -повышение активности «печеночных» трансаминаз в сыворотке крови.

При появлении побочных эффектов необходимо прекратить приём препарата и обратиться к врачу.

Передозировка

Симптомы: диарея, тошнота, изжога, кожный зуд, повышение активности «печеночных» трансаминаз в сыворотке крови.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Препараты, содержащие алюминия гидроксид, колестирамин, колестипол снижают абсорбцию и уменьшают эффект препарата. Одновременный приём нецелесообразен.

Одновременное применение препарата с холеретиками синтетического или растительного происхождения усиливает желчеобразование. Комбинация препарата со слабительными лекарственными средствами приводит к устранению запоров. Препарат способствует лучшему всасыванию жирорастворимых витаминов.

Применение препарата с антисептиками или химиотерапевтическими средствами при инфекционных процессах в печени или желчных путях улучшает терапевтическую эффективность последних.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами

Применение препарата не оказывает отрицательного влияния на способность к управлению транспортными средствами и занятиям другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной или светозащитной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

Контурные ячейковые упаковки вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку.

По 1, 2 или 5 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре от 15 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года. Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии потребителей

Открытое акционерное общество "Фармстандарт-Томскхимфарм"

(ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм"), Россия

634009, г. Томск, проспект Ленина, д. 211, тел./факс: (3822) 40-28-56, www.pharmstd.ru.

Производитель

Открытое акционерное общество "Фармстандарт-Томскхимфарм"

(ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм"), Россия

г. Томск, проспект Ленина, д. 211, тел./факс: (3822) 40-28-56, www.pharmstd.ru

Представитель

ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм"



Е.В. Толстова