

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Регейн®

(наименование лекарственного препарата)

пена для наружного применения 5 %

(лекарственная форма, дозировка)

АСМ Аэрозоль-Сервис АГ, Швейцария

(наименование производителя, страна)

Изменение № 2

100322

Дата внесения Изменения «___» _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав 1 г препарата содержит: <i>активное вещество</i> – миноксидил – 47,50 мг*; <i>вспомогательные вещества:</i> этанол безводный – 536,30 мг, вода очищенная – 314,10 мг, бутилгидрокситолуол – 0,90 мг**, молочная кислота – 10,00 мг, лимонная кислота безводная – 1,00 мг, глицерол – 20,00 мг, цетиловый спирт – 11,00 мг, стеариловый спирт – 5,00 мг, полисорбат 60 – 4,00 мг; <i>пропеллент</i> – пропан/н- бутан/	Состав 1 г препарата содержит: <i>действующее вещество</i> – миноксидил – 47,50 мг*; <i>вспомогательные вещества:</i> этанол безводный – 536,30 мг, вода очищенная – 314,10 мг, бутилгидрокситолуол – 0,90 мг**, молочная кислота – 10,00 мг, лимонная кислота безводная – 1,00 мг, глицерол – 20,00 мг, цетиловый спирт – 11,00 мг, стеариловый спирт – 5,00 мг, полисорбат 60 – 4,00 мг; <i>пропеллент</i> – пропан/н- бутан/

изобутан (%) (48 : 30 : 22) – 50,20 мг.	изобутан (%) (48 : 30 : 22) – 50,20 мг.
* Фактическое количество	* Фактическое количество
миноксидила, без пропеллента,	миноксидила, без пропеллента,
составляет 50,00 мг/г;	составляет 50,00 мг/г;
** Фактическое количество	** Фактическое количество
бутилгидрокситолуола, без	бутилгидрокситолуола, без
пропеллента, составляет 1,00 мг/г.	пропеллента, составляет 1,00 мг/г.

Представитель фирмы
Специалист по регистрации



А.В. Иванченко