

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Нафтизин плюс

наименование лекарственного препарата

капли назальные 0,05 % и 0,1 %

лекарственная форма, дозировка

ООО «Гротекс», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «___» 020217 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Противопоказания Повышенная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипертензия, выраженный атеросклероз, гипертиреоз, хронический ринит, тяжелые заболевания глаз, сахарный диабет, тахикардия, одновременный прием ингибиторов моноаминоксидазы и период до 14 дней после окончания их применения, возраст до 1 года (для 0,05 % раствора), возраст до 15 лет (для 0,1 % раствора). Способ применения и дозы Применяют интраназально (в каждый носовой ход). Взрослым и детям старше 15 лет назначают по 1-3 капли 0,05-0,1 % раствора препарата 3-4 раза в день. Детям применяют 0,05 % раствор: от 1 до 6 лет – по 1-2 капли, от 6 до 15 лет – по 2 капли 1-3 раза в день. Для диагностических целей – после очистки	Противопоказания Повышенная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипертензия, выраженный атеросклероз, гипертиреоз, хронический ринит, тяжелые заболевания глаз, сахарный диабет, тахикардия, одновременный прием ингибиторов моноаминоксидазы и период до 14 дней после окончания их применения, возраст до 2 лет (для 0,05 % раствора), возраст до 15 лет (для 0,1 % раствора). Способ применения и дозы Применяют интраназально (в каждый носовой ход). Взрослым и детям старше 15 лет назначают по 1-3 капли 0,05-0,1 % раствора препарата 3-4 раза в день. Детям применяют 0,05 % раствор: от 2 до 6 лет – по 1-2 капли, от 6 до 15 лет – по 2 капли 1-3 раза в день. Для диагностических целей – после очистки

носа в каждый носовой ход закапать 3-4 капли или ввести тампон, смоченный в 0,05 % растворе и оставить на 1-2 минуты. При ринитах курс лечения не должен превышать 5-7 дней у взрослых и не более 3 дней у детей.	носа в каждый носовой ход закапать 3-4 капли или ввести тампон, смоченный в 0,05 % растворе и оставить на 1-2 минуты. При ринитах курс лечения не должен превышать 5-7 дней у взрослых и не более 3 дней у детей.
--	--

Начальник отдела регистрации
ООО «Гротекс»



С. В. Сергеев