

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ФУРАЦИЛИН

раствор для местного и наружного применения [спиртовой] 0,067 %

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика», Россия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «18 07 14» 2014 г.

Старая редакция	Новая редакция
Лекарственная форма. Раствор для наружного применения [спиртовой].	Лекарственная форма. Раствор для местного и наружного применения [спиртовой].
Форма выпуска. Раствор для наружного применения [спиртовой] 0,067 %. По 10, 25, 50, 100 мл препарата во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полимерными и крышками полимерными навинчиваемыми. По 50, 100 мл во флаконы из полиэтилена, укупоренные пробками-капельницами, или дозаторами, или наконечниками полимерными и крышками полимерными. По 10, 25, 50, 100 мл во флаконы из по-	Форма выпуска. Раствор для местного и наружного применения [спиртовой] 0,067 %. По 10, 25, 50, 100 мл препарата во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полимерными и крышками полимерными навинчиваемыми. По 50, 100 мл во флаконы из полиэтилена, укупоренные пробками-капельницами, или дозаторами, или наконечниками полимерными и крышками полимерными. По 10, 25, 50, 100 мл во флаконы из по-

Старая редакция	Новая редакция
лиэтилентерефталата, укупоренные колпачками полимерными винтовыми. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Допускается укладка флаконов в групповую упаковку с равным количеством инструкций по применению (для стационаров). По 4,5 л в бутылки из полиэтилентерефталата (для стационаров). Бутылки помещают в групповую упаковку из картона с равным количеством инструкций по применению.	лиэтилентерефталата, укупоренные колпачками полимерными винтовыми. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Допускается укладка флаконов в групповую упаковку с равным количеством инструкций по применению (для стационаров). По 4,5 л в бутылки из полиэтилентерефталата (для стационаров). Бутылки помещают в групповую упаковку из картона с равным количеством инструкций по применению.

Директор ООО «Тульская
фармацевтическая фабрика»



Л.Я. Рабинович