

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ФОРМАГЕЛЬ®

Регистрационный номер

Торговое название: Формагель.

МНН или группировочное название: Формальдегид&

Лекарственная форма: гель для наружного применения.

Описание: бесцветный гель со слабым запахом формальдегида.

Состав:

Активное вещество: формальдегида (раствор 37 %)(формалин) – 100 мг, соответствует 37 мг формальдегида.

Вспомогательные вещества: метилцеллюлоза водорастворимая, вода очищенная до 1 г.

Фармакотерапевтическая группа: средство для лечения гипергидроза.

Код АТХ (D08AX).

Фармакологические свойства

Подавляет функцию потовых желез независимо от их секреции, оказывает дезинфицирующее и антисептическое действие.

Показания к применению

Повышенная потливость любого происхождения.

Противопоказания


Повышенная чувствительность к формальдегидсодержащим соединениям, в том числе к формалину, воспалительные заболевания кожи. Детский возраст до 16 лет.

Способ применения и дозы

Наружно. На участки кожи с повышенной потливостью (подошвы, ладони, межпальцевые складки) после гигиенического душа и высушивания Формагель® наносят тонким слоем на 30-40 мин. Затем препарат смывают теплой водой. На нежную чувствительную кожу (подмышечные впадины и ладони у женщин) препарат нужно наносить тонким слоем на срок не более 20 мин. После этого кожу следует тщательно вымыть теплой водой без моющих средств и припудрить тальком или детской присыпкой. После бритья подмышечных впадин Формагель® можно наносить не ранее, чем через сутки. Расход на одно применение – около 4 г. Одной процедуры достаточно, чтобы снизить потливость кожи на 7-12 дней. При резко выраженной потливости процедуру проводят 2-3 дня подряд. При необходимости применение Формагеля® можно повторить.

Побочное действие

Аллергические реакции. При длительном использовании – сухость кожи. В этом случае применение Формагеля® временно прекращают. В случае возникновения на месте нанесения раздражения (покраснение, жжение, отек) оно устраняется смазыванием кожи любыми корти-



костероидными кремом или мазью 1-2 раза в день или нанесением суспензии Циндол несколько раз в день до устранения раздражения.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не зарегистрировано.

Особые указания

Не допускать попадания препарата на слизистые оболочки и в области глаз.

При случайном попадании их необходимо обильно промыть водой.

Форма выпуска

Гель для наружного применения 3,7 % в тубах по 10 и 15 г. Тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Срок годности

5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения

При температуре от 18 до 22 °С.

В недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель:
ЗАО "Ретинойды", 111123, Москва, ул. Плеханова, д. 2/46 стр.5.
 Тел/факс: (495) 684-2187, 234-6118, 234-6119, e-mail: retinoids@yandex.ru
 Претензии потребителей направлять в адрес производителя.

И.о. директора ИДКЭЛС

А.Н.Васильев

Представитель ЗАО "Ретинойды"

В.И. Альбанова

