



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**  
**ТАНАЦЕХОЛ®**

**Регистрационный номер:** ЛС-002696

**Торговое наименование:** Танацехол®

**Международное непатентованное или группировочное наименование:**  
Пижмы обыкновенной цветков экстракт.

**Лекарственная форма**

Таблетки, покрытые оболочкой.

**Состав (на одну таблетку)**

*Действующее вещество:*

Танацехол® экстракт сухой (пижмы обыкновенной цветков экстракт сухой с содержанием суммы флавоноидов и фенолкарбоновых кислот 50,00 % в пересчете на лютеолин) - 0,05000 г

*Вспомогательные вещества (ядро):*

лактозы моногидрат, крахмал картофельный, кремния диоксид коллоидный (Аэросил А-380), кальция стеарат;

*Вспомогательные вещества оболочки:*

сахароза, повидон (поливинилпирролидон) низкомолекулярный медицинский 12600 ± 2700, магния гидроксикарбонат, желатин, титана диоксид, кремния диоксид коллоидный (Аэросил А-380), воск пчелиный, тропеолин 0.

Танацехол® экстракт сухой получают из Пижмы обыкновенной цветков экстракцией спиртом этиловым 90 % в соотношении (готовый продукт : лекар-

ственное растительное сырье : спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья) 1 : 41,5 : 80,0; соотношение лекарственное растительное сырье : экстракт сухой – 41,5 : 1.

### **Описание**

Таблетки круглые двояковыпуклой формы, покрытые оболочкой, светло-желтого цвета.

### **Фармакотерапевтическая группа**

Желчегонное средство растительного происхождения.

Код АТХ: А05АХ.

### **Фармакологические свойства**

Танацехол<sup>®</sup> получают из цветков пижмы обыкновенной *Tanacetum vulgare* L. семейства астровые *Asteraceae*.

**Фармакодинамика.** Препарат усиливает образование и выделение желчи, способствует изменению ее биохимического состава. Оказывает спазмолитическое действие на желчный пузырь, желчные протоки и кишечник.

**Фармакокинетика.** Препарат представляет собой очищенный сухой экстракт пижмы обыкновенной цветков и содержит комплекс биологически активных соединений, в связи с чем проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

### **Показания к применению**

Применяют в комплексной терапии у взрослых в качестве желчегонного и спазмолитического средства при хронических некалькулезных холециститах, дискинезии желчевыводящих путей по гипомоторному типу, а также у больных с постхолецистэктомическим синдромом.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, эрозивный гастродуоденит, желчекаменная болезнь, период беременности и грудного вскармливания, возраст до 18 лет, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, непереносимость лактозы, дефицит лактазы.

## **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано (в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности препарата у данной категории пациентов).

## **Способ применения и дозы**

Внутрь по 1-2 таблетки 3-4 раза в сутки за 15-20 минут до еды. Курс лечения 20-30 дней. Если был пропущен прием препарата или было принято недостаточное его количество, последующий прием следует проводить так, как это указано в данной инструкции, без каких-либо изменений.

Если через 2 недели лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

## **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции, изжога, диарея. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

### **Передозировка**

До настоящего времени случаев передозировки препаратом не зарегистрировано.

При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление дозозависимых побочных эффектов препарата.

Лечение: симптоматическое.

### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Возможно применение в сочетании с препаратами, применяемыми в гастроэнтерологии (ферменты, антацидные препараты, активированный уголь).

Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата Танацехол<sup>®</sup> проконсультируйтесь с врачом.

### **Особые указания**

Пациентам с сахарным диабетом, следует учитывать, что одна таблетка препарата содержит 0,14 г углеводов, что соответствует 0,012 ХЕ (хлебных единиц).

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

### **Форма выпуска**

Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг.

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

3 контурные ячейковые упаковки № 10 вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

#### **Условия хранения**

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности.** 5 лет. Не применять по истечении срока годности.

#### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

#### **Держатель регистрационного удостоверения**

Акционерное общество «Фармцентр ВИЛАР».

Адрес: Россия, 123458, город Москва, улица Маршала Прошлякова, дом 30, этаж 2, офис 206.

#### **Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей**

Акционерное общество «Фармцентр ВИЛАР».

Адрес места производства лекарственного препарата (производственной площадки): Россия, 117216, город Москва, улица Грина, дом 7, строение 15, строение 27, строение 29.


Тел./факс: (495) 388-47-00.

Интернет-сайт: [www.vilar-plant.ru](http://www.vilar-plant.ru)

Генеральный директор

АО «Фармцентр ВИЛАР»



 В.В. Степанов