

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

Метопролол ретард-Акрихин

**таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, 50 мг, 100 мг**

Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»
(АО «АКРИХИН»), Россия

Изменение № 3

22 08 22

Дата внесения Изменения «____» _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Торговое название препарата: Метопролол ретард-Акрихин	Торговое наименование препарата: Метопролол ретард-Акрихин
Состав Одна таблетка содержит: <i>действующее вещество:</i> метопролола сукцинат 23,83 мг, 47,66 мг и 95,32 мг, что эквивалентно 25 мг, 50 мг и 100 мг метопролола тартрата соответственно; <i>вспомогательные вещества:</i> гипромеллоза 155,96 мг, 161,92 мг и 184,84 мг; лудипресс ЛЦЕ [лактозы моногидрат 94,7–98,3 %, повидон 3–4	Состав Одна таблетка содержит: <i>действующее вещество:</i> метопролола сукцинат 23,83 мг, 47,66 мг и 95,32 мг, что эквивалентно 25 мг, 50 мг и 100 мг метопролола тартрата соответственно; <i>вспомогательные вещества:</i> гипромеллоза, лудипресс ЛЦЕ [лактозы моногидрат 94,7–98,3 %, повидон 3–4 %], кремния диоксид коллоидный,


%] 117,21 мг, 87,42 мг или 412,84 мг; кремния диоксид коллоидный 1,5 мг, 1,5 мг или 3,5 мг; магния стеарат 1,5 мг, 1,5 мг или 3,5 мг соответственно. <i>Состав оболочки:</i> Для таблеток с дозировками 25 мг и 100 мг – готовая смесь «Опадрай II» оранжевого цвета (поливиниловый спирт 6 мг или 14 мг, тальк 2,22 мг или 5,18 мг, макрогол 3,03 мг или 7,07 мг, титана диоксид 3,36 мг или 7,84 мг, краситель железа оксид красный 0,009 мг или 0,021 мг, краситель железа оксид желтый 0,378 мг или 0,882 мг, краситель железа оксид черный 0,003 мг или 0,007 мг) 15 мг или 35 мг соответственно. Для таблеток с дозировкой 50 мг – готовая смесь «Опадрай II» зеленого цвета (поливиниловый спирт 6 мг, тальк 2,22 мг, макрогол 3,03 мг, титана диоксид 2,925 мг, краситель хинолиновый желтый (алюминиевый лак) 0,268 мг, краситель железа оксид черный 0,015 мг, краситель индигокармин (алюминиевый лак) 0,542 мг) 15 мг.	магния стеарат. <i>Состав оболочки:</i> Для таблеток с дозировками 25 мг и 100 мг – готовая смесь «Опадрай II» оранжевого цвета (поливиниловый спирт, тальк, макрогол, титана диоксид, краситель железа оксид красный, краситель железа оксид желтый, краситель железа оксид черный). Для таблеток с дозировкой 50 мг – готовая смесь «Опадрай II» зеленого цвета (поливиниловый спирт, макрогол, титана диоксид, краситель хинолиновый желтый (алюминиевый лак), краситель железа оксид черный, краситель индигокармин (алюминиевый лак)).
--	---

Раздел отсутствует	Держатель регистрационного удостоверения Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»), Россия 142450, Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29.
Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»), Россия 142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29. Телефон/факс: +7 (495) 702-95-03.	Производитель Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»), Россия 142450, Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29, стр. 3, 4, 6. Организация, принимающая претензии потребителей Акционерное общество «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (АО «АКРИХИН»), Россия 142450, Московская область, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29. Телефон/факс: +7 (495) 702-95-03.

Представитель фирмы



Е.С. Волкова



148996