

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

НЕМОЗОЛ®

Nemozole®

таблетки покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, 400 мг

Ипка Лабораториз Лимитед, Индия

Изменение № 2

Дата внесения Изменения " 27.04.17 " 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: Каждая таблетка покрытая пленочной оболочкой содержит: <i>Активное вещество:</i> албендазол – 200,00/400,00 мг <i>Вспомогательные вещества:</i> кукурузный крахмал - 129,70/97,00 мг, натрия лаурилсульфат - 4,00/5,00 мг, повидон (поливинилпирролидон К 30) – 3,350/5,00 мг, метилпарагидроксибензоат - 0,270/0,360 мг, пропилпарагидроксибензоат - 0,030/0,040 мг, желатин - 3,70/5,480 мг, тальк очищенный - 6,70/12,00 мг, натрия карбоксиметилкрахмал - 3,350/5,20 мг, кремния диоксид коллоидный - 2,00/3,00 мг, магния стеарат - 2,00/3,00 мг. Оболочка: гипромеллоза - 2,40/6,640 мг, диоксид титана - 1,80/4,00 мг, тальк очищенный - 1,20/0 мг, натрия	Состав: Каждая таблетка покрытая пленочной оболочкой содержит: <i>Активное вещество:</i> албендазол – 200,00/400,00 мг <i>Вспомогательные вещества:</i> кукурузный крахмал – 129,70/83,00 мг, кукурузный крахмал высушенный – 0/10,00 мг, натрия лаурилсульфат - 4,00/5,00 мг, повидон (поливинилпирролидон К 30) – 3,350/5,00 мг, метилпарагидроксибензоат - 0,270/0,360 мг, пропилпарагидроксибензоат - 0,030/0,040 мг, желатин - 3,70/5,50 мг, тальк очищенный - 6,70/10,00 мг, натрия карбоксиметилкрахмал - 3,350/5,20 мг, кремния диоксид коллоидный - 2,00/3,00 мг, магния стеарат - 2,00/3,00 мг. Оболочка: гипромеллоза - 2,40/5,32 мг, диоксид титана - 1,80/3,20 мг, тальк

Старая редакция	Новая редакция
лаурилсульфат - 0,10/0 мг, макрогол 400 - 0,500/0 мг, пропиленгликоль - 0/2,00 мг.	очищенный - 1,20/1,60 мг, натрия лаурилсульфат - 0,10/0 мг, макрогол 400 - 0,500/0 мг, пропиленгликоль - 0/1,60 мг.

Менеджер по регистрации ЛС
компании Ипка Лабораториз Лимитед



Колмакова Н.Н.